

โรคไข้ฉี่หนู ความรู้ที่มักเข้าใจผิด

X เกิดจากหนูเป็นตัวนำโรคเท่านั้น

▼ วัว ควาย หมู แพะ แกะ สุนัข
สามารถนำโรคมานสู่คนได้

X เกิดจากการสัมผัสปุ๋ยเคมี
หรือยาฆ่าหญ้า



▼ เกิดจากการได้รับเชื้อจากสัตว์
โดยตรงหรือสัมผัสสิ่งแวดล้อม
ที่มีเชื้อ

X หากมีไข้ ปวดหัว หลังลุยน้ำหรือ
ย่ำดินที่ชื้นแฉะ ไปซื้อยามากินเองก็ได้

▼ หากมีอาการดังกล่าว แต่ไปพบ
แพทย์ช้า ไม่ได้รับการรักษา
ที่ถูกต้อง จะเสียชีวิตได้

การป้องกัน

ยึดหลัก 4 ลด ปลอดภัยจากโรคไข้ฉี่หนู



ลดหนู

กำจัดหนู ทำความสะอาด
บ้านเรือน



ลดสัมผัส

ขณะลุยน้ำอย่าโคลนควรสวม
รองเท้าน้ำ และหลีกเลี่ยงการ
ลงน้ำที่เป็นจุดเสี่ยง



ลดการเสียชีวิต

หากมีไข้ ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ
โดยเฉพาะที่น่องหรือโคนขา
ให้รีบไปพบแพทย์ทันที



ลดการระบาด

เมื่อพบผู้ป่วยในพื้นที่
ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เพื่อควบคุมโรค

ไปทุ่งลงสวน ไปนาทำไร่
ใส่บู๊ทเร็วไว **ป้องกันไข้ฉี่หนู**



Google play




App Store

DDC
1422
สายด่วนกรมควบคุมโรค




โรค เลปโต สไปโรซิส



โรคเลปโตสไปโรซิส

หรือ “โรคไข้หนู” เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย “เลปโตสไปรา” เป็นได้ทั้งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกือบทุกชนิด เช่น วัว ควาย หมู แพะ แกะ สุนัข รวมทั้ง หนู ซึ่งเป็นสัตว์นำโรคที่สำคัญ มักพบผู้ป่วยมากในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะที่ภาคใต้และภาคอีสาน



การติดต่อ

ทางตรง

สัมผัสกับปัสสาวะหรืออวัยวะของสัตว์ที่ติดเชื้อ



ทางอ้อม

- สัมผัสกับน้ำหรือดินที่มีเชื้อ โดยเชื้อจะเข้าทางผิวหนังที่มีบาดแผลหรือเยื่อบุตา จมูก และปาก



- กินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อน เช่น อาหารที่มีหนูฉี่ใส่



กลุ่มเสี่ยง



ชาวนา ชาวสวน (สวนยาง สวนปาล์ม สวนผลไม้) คนหาปลาในแหล่งน้ำที่มีเชื้อ



คนเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย หมู สุนัข



ผู้ประสบอุทกภัย หรืออยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง

พฤติกรรมเสี่ยง

- แช่น้ำบ่อยครั้งหรือเป็นเวลาหลายชั่วโมง
 - มีบาดแผลที่ผิวหนังขณะลุยน้ำหรือย่ำดินที่ชื้นแฉะ
 - อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังหรือบริเวณที่มีหนูชุกชุม
- โดยไม่สวมรองเท้าบูทป้องกัน

อาการที่พบ

มีไข้เฉียบพลัน (1 - 2 สัปดาห์หลังลุยหรือแช่น้ำนาน) ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่น่องหรือโคนขา คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ตาแดง ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะออกน้อยจากภาวะไตวาย ไอคิวเป็นเลือด หายใจลำบาก และเสียชีวิตในที่สุด

